



什麼時候需要隔離？

具感染風險民眾追蹤管理機制

介入措施	居家隔离	居家檢疫	自主健康管理
對象	確定病例之接觸者	具中港澳旅遊史者	對象1:申請赴港澳獲准者 對象2:通報個案但已檢驗陰性且符合解除隔離條件者
負責單位	地方衛生主管機關	地方政府民政局/里長或里幹事	衛生主管機關
方式	居家隔离14天 主動監測1天2次	居家檢疫14天 主動監測1天1~2次	自主健康管理14天
配合事項	<ul style="list-style-type: none">衛生主管機關開立「居家隔离通知書」。衛生主管機關每日追蹤2次健康狀況。隔離期間留在家中(或指定地點)不外出,亦不得出境或出國,不得搭乘大眾運輸工具。有症狀者由衛生主管機關安排就醫。如未配合中央流行疫情指揮中心防治措施,將依傳染病防治法裁罰,必要時進行強制安置。	<ul style="list-style-type: none">主管機關開立「旅客入境健康聲明暨居家檢疫通知書」,配戴口罩返家檢疫。里長或里幹事進行健康關懷14天,每日撥打電話詢問健康狀況並記錄「健康關懷紀錄表」。檢疫期間留在家中(或指定地點)不外出,亦不得出境或出國,不得搭乘大眾運輸工具。有症狀者將送指定醫療機構採檢送驗,衛生主管機關加入主動監測。如未配合中央流行疫情指揮中心防治措施,將依傳染病防治法裁罰,必要時進行強制安置。	<ul style="list-style-type: none">自主健康管理期間應盡量避免外出,如需外出應全程配戴外科口罩;落實呼吸道衛生及咳嗽禮節每日早/晚各量體溫一次;期間如出現不適症狀,請立即撥打防疫專線1922依指示就醫。
法令依據	傳染病防治法第48條	傳染病防治法第58條	傳染病防治法第36條



隔離時需注意？

我正在 居家隔离／居家檢疫 我該怎么做？

- ◆隨時配戴口罩,待在家中不得外出。
- ◆和同住者保持1公尺以上距離,減少接觸(例如:同桌用餐)。
- ◆咳嗽或打噴嚏時,口罩不可拿下,或用衛生紙遮住口鼻。接觸到呼吸道分泌物後應用肥皂洗手。
- ◆每日早晚各量一次體溫,詳實記錄體溫與健康狀況,並如實回報負責人員。
- ◆出現不適症狀立刻通知居家隔离／檢疫通知書上之聯絡人、所在地衛生局,或撥1922,依指示就醫。禁止自行搭乘大眾交通運輸工具就醫。

中央流行疫情指揮中心

我的同住者正在 居家隔离／居家檢疫 我該怎么做？

- ◆和居家隔离／檢疫者保持1公尺以上距離,減少接觸(例如:同桌用餐)。
- ◆盡量配戴口罩。
- ◆肥皂勤洗手。觸摸眼口鼻前應先洗手。
- ◆出現不適症狀立刻通知居家隔离／檢疫通知書上之聯絡人、所在地衛生局,或撥1922,依指示就醫。

中央流行疫情指揮中心

2019 新型冠狀病毒 (武漢肺炎) 防疫須知

【本刊訊】二〇一九新型冠狀病毒目前正危害著我們的正常生活,為有效防止疫情蔓延,並降低民眾對於疫情的恐懼,本刊整理中央流行疫情指揮中心相關防疫資訊,若在家隔離,須注意什麼?什麼情形才須到醫院就診?該怎麼保護自身健康?不懼病毒,做好準備,身心健康皆能具備。

戴口罩三時機

另外中央流行疫情指揮中心表示,民眾無須恐慌搶購口罩,呼籲口罩使用時機仍應著重在「看病、陪病、探病的時候要戴,有呼吸道症狀者應戴口罩,有慢性病患者外出建議戴口罩」,而健康民眾及一般學生無須戴口罩,上學上課仍不須戴口罩。落實上述使用口罩的三個時機及原則,使口罩資源發揮最大效用。



口罩不用搶,留給有需要的人。

有政府 · 請安心

其實您 不用一直戴口罩

身體健康、戶外運動 都不用戴口罩

什麼時候戴?

出入醫院者、有發燒或呼吸道症狀者、免疫較差者要戴口罩

近距離、密閉空間長時間接觸人群可考慮配戴口罩



中央流行疫情指揮中心

高雄榮總受命南區主責醫院 聯合六院 共同守護南部國門

↓高榮嚴格管制醫院各大出入口,設置紅外線體溫測量站,力求防疫措施滴水不漏。(圖/高榮)

七、主動協助榮民之家防疫整備,照顧榮民健康。

六、急診空間超前部署,成立戶外發燒篩檢站及專屬診療室。

五、成立防疫特別門診,照顧特需民眾健康需求。

四、為降低慢性病患感染風險,簡化流程,成立慢性處方箋戶外領用專區。

三、強化員工感染管制教育,要求員工進行健康管理,每日進行體溫監測及通報。

二、檢核疾病旅遊史:配合政府防疫,進入院區除量測體溫及詢問病史旅遊史外,並刷健保卡,確認近期有無出入入境疫區,避免民眾隱匿旅遊史。

一、落實全院門禁、動線管制措施。

高榮因應嚴重特殊性傳染性肺炎疫情,採取最高標準感控措施:



←高榮配合政府防疫,進入院區嚴格執行量測體溫。(圖/高榮)



↑高榮院長林曜祥(前右2)帶領專業醫療團隊,多次召開防疫應變會議,維護國人健康。(圖/高榮)